第9卷 第4期
Vol. 9, No. 4

1989年10月
Oct., 1989

杏属一新变种和变型

李体智

ONE VARIETY AND ONE FORMA OF ARMENIACA MILL. (ROSACEAE) FROM CHINA

Li Ti-zhi

〔提要〕 本文发表了杏属一新变种和变型，即溆浦杏 *Armeniaca holosericea* (Batal.) Kost. var. *xupuensis* T. Z. Li 和大果辽杏 *A. mandshurica* (Maxim.) Skv. f. *major* T. Z. Li

溆浦杏 新变种 图1

Armeniaca holosericea (Batal.) Kost. var. **xuPuensis** T. Z. Li, var. nov.

A var. *holosericea* differt endocarpio suhrotundato, extus foveotato, fructibus apice acutis, foliis late ovatis vel subrotundatis, juventute rubris.

Hunan: Xupu., Zhongxiaxiang, alt. 210m, 17 V 1985, T. Z. Li. B 11001 (**holotype**, deposited in Herb. L. P. I. P)

图1 溆浦杏 **A. holosericea** (Batal.) Kost. var. **xupuensis** T. Z. Li

本变种与原变种不同为核近圆形，表面呈蜂窝状，果实顶端突尖；叶片宽卵形或近圆形，幼时红色。

湖南：溆浦，仲夏乡海拔210米，1985年5月17日，李体智 B 11001 （模式标本存于辽宁省果树科研所标本室）。

大果辽杏 新变型 图2

Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skv. f. **major** T. Z. Li f. nov.

A f. *mandshurica* differt fructibus ovoideis, apice acutis, circ. 3.5cm diam., endocarpio ovoideo-ellipsoideo, dense rugoso.

本文作者工作单位：辽宁，熊岳，辽宁省果树科研所 (Liaoning Provinciat Institute of Pomology, Xiongyue, Liaoning)

图2　大果辽杏 A. mandshurica (Maxim.) Skv. f. major T. Z. Li

Liaoning: Xionyue, all. 22m, 226 IV 1988, T. Z. Li B 31002 (holotype, deposited in Herb. L. P. I. P)

本变型与原变型区别为果实卵球形，顶端突尖，核卵球状椭圆形，密被皱纹。

辽宁：熊岳，海拔22米，1988年4月26日，李体智 B 31002（模式标本存于辽宁省果树科研所标本室）。